



FUNDAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL  
GETÚLIO VARGAS

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL  
PADRÃO  
Nº 1.1.016**

**Atividade:**

Curativo de acesso venoso central

**Data da Emissão:**

27/03/2015

**Data da próxima revisão:**

13/11/2021

**Data da revisão:**

13/11/2019

**Edição:**

04

**Responsável:**

Enfermeiro

**Objetivo:**

Realizar curativo em cateter central com a finalidade de manter a permeabilidade e a assepsia relacionada ao manuseio do acesso evitando contaminações, obstruções e prevenindo possíveis infecções.

**Material:**

- Curativo de filme transparente;
- Par de luvas de procedimento;
- Pacote de curativo;
- Pacotes de gaze estéril;
- Clorexidina alcóolica 2%;
- Saco de lixo pequeno;
- Bandeja;
- Caneta

**Principais atividades**

**Responsável**

- Preparar bandeja com materiais necessários;
- Lavar as mãos;
- Identificar o paciente pelo nome e leito;
- Orientar o paciente/ acompanhante sobre o procedimento;
- Orientar ao paciente quando possível, que mantenha o rosto virado para o lado contrário do curativo;
- Colocar saco de lixo em local próximo do leito;
- Colocar a bandeja em local adequado, de forma a não cruzar o material contaminado com o material esterilizado
- Calçar as luvas de procedimento;
- Retirar curativo anterior e despreza-lo no saco de lixo;
- Realize troca de luva de procedimento;
- Abrir o pacote de curativo, colocando as gazes no campo;
- Limpar a inserção do cateter com gaze e clorexidina alcóolica 2%;
- Limpar pele ao redor da inserção do cateter com gaze e clorexidina alcóolica 2%;
- Secar a inserção do cateter e pele peri inserção com gaze;
- Abrir o pacote do curativo transparente e adesivar na pele do paciente;
- Identificar curativo com data turno e nome;
- Recolher sujo/ contaminado o material para a bandeja;
- Despresar e ou encaminhar ao expurgo o material adequadamente;
- Lavar as mãos;
- Realizar checagem do procedimento e anotações de enfermagem no prontuario do paciente.

Enfermeiro

**Observações:**

- Responsabilidade exclusiva do enfermeiro. Observar e anotar as condições da pele e/ou presença de secreção no local da inserção; na presença de sinais de infecção, o cateter deve ser retirado e a ponta enviada para cultura;
- Primeiro curativo manter com gaze e micropore por 24 horas;
- Validade do curativo transparente íntegro: 07 dias;  
Caso indisponível pacote de curativo, utilize luva estéril.

**Resultado Esperado:**

Observar permeabilidade venosa, prevenir infecção, proteger contra deslocamento e tração.

**Referência Bibliográfica:**

Procedimentos de Enfermagem: Guia Prático. Guanabara Koogan, 2009

**Elaborado por:**

Rafaella Giacomoni  
Coord. Da Linha do Cuidado Adulto

**Revisado por:**

Aline Steffen  
Enfermeira

**Aprovado por:**

Loredi Becker  
Diretora Hospitalar