



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.1.019

Atividade: Administração de medicamentos e nutrição por SNE.	Data da Emissão: 27/03/2015	Data da Revisão: 18/11/2021
	Data da revisão: 18/11/2019	Edição: 04
Responsável: Enfermeiro/Téc. De Enfermagem		
Objetivo: <ul style="list-style-type: none">• Padronizar os procedimentos de administração de nutrição enteral.• Administração de medicamentos.• Alimentação e hidratação do estado nutricional do paciente.		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">• Seringa de 20 ml;• Estetoscópio;• Dieta Enteral Sistema Fechado;• Bomba de Infusão;• Equipo de Dieta;• Adaptador;• Frasco de Água;• Equipo para Frasco de Água;• Copo com água potável.		
Principais atividades		Responsável
<ul style="list-style-type: none">• Após Liberação Médica do RX confirmando posição da SNE;• Lavar as mãos;• Orientar o paciente sobre o que será feito;• Preparar o material;• Disponibilizar o material;• Conectar equipo na Dieta;• Preencher o equipo com dieta;• Instalar o equipo na Bomba de Infusão;• Programar Volume Alvo na Bomba Infusão Conforme etiqueta no frasco;• Testar SNE a cada 6 hs e antes do início da dieta;• Posicionar o paciente em posição no mínimo de Fowler 45º;• Calçar luvas;• Introduzir equipo na SNE;• Iniciar infusão do volume de dieta conforme avaliação da nutricionista;• Registrar na folha de controle de administração de dieta o volume infundido a cada 6h sem zerar a bomba;• O frasco da água será encaminhado pelo SND, 4x ao dia conforme previa avaliação do Nutricionista ou solicitação médica;• Conecta-se o equipo no frasco de água, e este será conectado na SNE;• Não é necessário pausar infusão de dieta, durante a infusão de água;• Anotar o volume de água infundido no paciente;• Quando atingir o volume de dieta alvo a Bomba de Infusão deverá ser zerada e desligada;• Administração de 20 ml de água por SNE deverá ser realizada a cada 8 horas, exceto nos momentos em que esteja ocorrendo por frasco.		Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e ou Auxiliar de Enfermagem.
Observações: <ul style="list-style-type: none">• Após administrar medicamentos lavar a sonda com no mínimo 40 ml de água, atentar ao paciente com restrição hídrica.• Troca de equipo de dieta e de água deverá ocorrer a cada 24 horas Troca da dieta enteral de sistema fechado deverá ser a cada 24hr ou quando necessário.		

Resultado Esperado:

Administração de nutrição enteral e medicamentos de forma padronizada e com segurança.

Referência Bibliográfica:

SOUZA, V.H.S; MOZACHI, N. O Hospital: Manual do ambiente hospitalar. 2º ed. Curitiba: Os Autores, 2005.

Elaborado por:

Rafaella Giacomoni
Coord. LCA

Revisado por:

Tiago Plá Pereira
RT de Enfermagem

Aprovado por:

Loredi Becker
Diretora Hospitalar HMGV