

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Nº 1.1.040**

Atividade: Administração de Medicamentos – Via Subcutânea	Data da Emissão: 31/03/2015	Data da Próxima Revisão: 26/11/2021
	Data da Revisão: 26/11/2019	Edição: 04

Responsável:
Enfermeiro, Técnicos em Enfermagem.

Objetivo:
Promover a absorção contínua e lenta de determinada medicação provocando o mínimo de traumatismo tecidual.
Usada para administração de vacinas, anticoagulantes e hipoglicemiantes (insulina).

Material Necessário:

- Prescrição Médica
- Medicamento;
- Luvas de procedimento;
- Agulha 13x4,5;
- Seringa de 1 ml;
- Algodão embebido em álcool 70%;
- Algodão seco;
- Bandeja.

Principais Atividades	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> • Certificar-se da prescrição médica, observando o nome do paciente, a medicação, a via de administração, a dosagem e o horário; • Higienizar as mãos; • Ler o rótulo do medicamento, verificando a data de validade; • Levar o medicamento até o leito do paciente em uma bandeja; • Conferir os 11 certos antes de administrar a medicação: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1º CERTO: Paciente Certo ✓ 2º CERTO: Medicamento Certo ✓ 3º CERTO: Dose Certa ✓ 4º CERTO: Aspecto da medicação Certa ✓ 5º CERTO: Validade Certa ✓ 6º CERTO: Via Certa. ✓ 7º CERTO: Hora Certa ✓ 8º CERTO: Compatibilidade medicamentosa Certa ✓ 9º CERTO: Orientação Certa ✓ 10º CERTO: Direito de recusa de medicação ✓ 11º CERTO: Registro Certo • Esclarecer dúvidas sobre a medicação que o paciente receberá; • Calçar as luvas; • Escolher o local para administração do medicamento (parte superior do deltóide, face superior externa do braço, face anterior da coxa, face anterior do antebraço, gordura abdominal); • Posicionar o cliente de modo que auxilie no relaxamento do músculo, evitando o extravasamento e minimizando a dor; • Fazer a anti-sepsia do local com o algodão embebido em álcool 70%; • Fazer a prega de tecido e introduzir a agulha na pele em um ângulo de 30° para indivíduos magros, 45° para indivíduos normais e 90° para indivíduos obesos; • Proceder à aspiração antes de injetar o medicamento no músculo, para 	<p>Enfermeiro e ou Técnico de Enfermagem</p>

<p>certificar-se que nenhum vaso sanguíneo foi atingido;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Injetar o líquido, empurrando lentamente o êmbolo; • Retirar o conjunto, agulha e seringa, em um movimento único; • Utilizar o algodão seco para tamponar, evitando que o medicamento extravase; • Descartar seringa/agulha em recipientes pérfuro-cortante; • Retirar as luvas; • Higienizar as mãos; • Checar a medicação no prontuário e anotar qualquer intercorrência. 		
<p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicar o Enfermeiro responsável no caso de qualquer alteração; • Realizar rodízio do local de administração. 		
<p>Resultado Esperado: Realização do procedimento na técnica correta e de forma segura.</p>		
<p>Referência Bibliográfica: Portal de Enfermagem. Administração medicação subcutânea. Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/administracao-de-medicamentos-por-via-subcutanea/30658 FIGUEIREDO, N.M.A.; VIANA, D.L.; MACHADO, W.C.A. Tratado prático de enfermagem. 2 Ed. v.2. São Caetano do Sul: Yedis Editora, 2008.</p>		
<p>Elaborado por: Patricia Bienert Diretora de Atenção a Saúde</p>	<p>Revisado por: Aline Steffen Enfermeira</p>	<p>Aprovado por: Loredi Becker Diretora Hospitalar</p>