



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.6.33

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Atividade:</b><br>Administração de vitamina K em RN   | <b>Data da Emissão:</b><br>04/01/2015                 | <b>Data da Revisão:</b><br>08/04/2021                    |
|  | <b>Data da Revisão:</b><br>08/04/2019                 | <b>Edição:</b> 03  |
| <b>Responsável:</b><br>Equipe de enfermagem  |   |  |
| <b>Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitar hemorragia no RN;</li><li>• Auxiliar diagnóstico e tratamento;</li></ul>   |   |  |
| <b>PRINCIPAIS ATIVIDADES</b>   |   |  |
| <b>Material necessário:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seringa de 1ml (descartável);</li><li>• Agulha;</li><li>• Algodão com álcool a 70% e algodão seco;</li><li>• Ampola com vitamina K;</li></ul>  |   |  |
| <b>Procedimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavar as mãos;</li><li>• Reunir o material e leva-lo até o RN;</li><li>• Aspirar para a seringa 0,1ml de vitamina K;</li><li>• Proceder a anti-sépsia do músculo com algodão embebido em álcool 70%, demarcando o vasto lateral da coxa esquerda entre o dedo indicador e o polegar;</li><li>• Introduzir a agulha no músculo com a seringa no ângulo de 90º em relação ao membro;</li><li>• Aspirar a seringa, certificando-se que não puncionou um vaso;</li><li>• Injetar a medicação;</li><li>• Retirar a agulha protegendo a pele com algodão;</li><li>• Guardar o material;</li><li>• Registrar na folha de controle e checar prontuário;</li></ul> |   |  |
| <b>Observações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assepsia correta bem como local da aplicação.</li></ul>  |   |  |
| <b>Referência Bibliográfica:</b><br>OLIVEIRA, G. <i>Blackbook Pediatria</i> . 4 ed. Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2011.   |   |  |
| <b>Elaborado por:</b><br>Enfª. Patrícia Bienert<br>Coord. LCMB   | <b>Revisado por:</b><br>Tiago Plá<br>RT de Enfermagem | <b>Aprovado por:</b><br>Loredi Becker<br>Dir. Hospitalar |